





18. 9. 1938  
О  
ГНИЛОЙ и НЕРВНОЙ  
ГОРЯЧКѢ.

---

335.



9

ПОЧТЕН И ПОЛНЪ

ДЯВЪЛЪ

333



О  
ГНИЛОЙ и НЕРВНОЙ  
ГОРЯЧКѢ.

---

Сочиненіе  
Доктора Медицины и Хирургіи  
СЕМЕНА ГАЕВСКАГО.

---

Одобренное Медицинскимъ Совѣщомъ  
Министерства Полиціи.

---


САНКТПЕТЕРБУРГЪ,  
въ Медицинской типографіи  
1813.





Interest enim, fatigatio morbum, an sitis; an frigus,  
an calor; an vigilia, an fames fecerit; an cibi vini que  
abundantia, an intemperantia libidinis.

C. CELSUS.





## ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

Предлагая краткое описаніе нервной и гнилой горячки, обязанностію счисляю предварительно извѣстить читателя, что я, сколь возможно, старался представить здѣсь начертаніе того вида, въ каковомъ болѣзни сіи въ нынѣшнее время чаще замѣчаются. Показавъ опличительные ихъ припадки, и объяснивъ главнѣйшія причины и признаки счастливаго или не благополучнаго ихъ окончанія, я описалъ и способъ леченія оныхъ, опытными врачами одобряемый. Всякому врачу извѣстно, сколь разнообразно и сколь запущано *угеніе* о ближайшей причи-





нѣ или сущности горячки! Нѣтъ, думаю я, ни одного писателя, который бы по сему предмету во всемъ совершенно согласовался съ другими. Посему, избѣгая всякихъ умствѣнныхъ предположеній, могущихъ быть для не опытныхъ врачей опаснымъ камнемъ преткновенія и, не вдаваясь въ теоретическія объясненія, руководствовался я правилами, изъ опыта почерпнутыми.

---

Февраля 1813.



О

## ГНИЛОЙ и НЕРВНОЙ ГОРЯЧКЪ.

§ I.

### НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНИ.

Горячки, во многихъ мѣстахъ нынѣ свирѣпствующія, суть тѣ самыя, которыя во врачебныхъ системахъ называются горячками, отъ изнуренія силъ происходящими (*Febres asthenicae*, *Typhi*), или нервными (*F. nervosae*), или гошпитальными (*F. castrenses*, *nosocomiales*), или горячками съ пятнами (*F. petechiales*).

Не входя въ изслѣдованіе, справедливы ли упомянутыя названія, мы приступимъ къ начертанію тѣхъ припадковъ и болѣзненныхъ явленій, коими сіи горячки обыкновенно сопровождаются.

## Н а ч а л о б о л ѣ з н и .

Когда болѣзнь сія начинается, то чувствуется во всемъ тѣлѣ такая тяжесть и усталость, что и легкое движение не рѣдко причиняетъ боль; мягкія части тѣла кажутся, какъ будто разбиты, а особливо поясница и ноги. Больные бываютъ малодушны и печальны, у нѣкоторыхъ напротивъ бываетъ особенное равнодушіе, такъ что не заботясь ни объ чемъ и о собственной помощи мало помышляютъ.

Позывъ на пищу вовсе прерывается; вкусъ во рту бываетъ не пріятный, часто горькій; часто же не ощущаютъ больные почти никакого вкуса; напротивъ жажда въ первые дни бываетъ довольно сильная и припомъ больные большею частію желаютъ пить холодное и кисловатое. Сверхъ сего примѣчаются припадки, производящіе отъ испорченнаго пищеваренія, и отъ простуды, какъ то: тошнота, иногда и рвота, давленіе около предсердія, испражнения большею частію жидкія; ка-



шель, иногда съ болью въ груди, труднымъ дыханіемъ, сиповатымъ голосомъ и насморкомъ; въ мышцахъ судорожное подергиваніе, особливо послѣ движенія; частое содроганіе и подираніе по кожѣ, а иногда и сильный ознобъ.

Къ симъ припадкамъ присоединяются еще слѣдующіе: шумъ въ ушахъ, круженіе, чрезмѣрная тяжесть и боль въ головѣ; лицо большею частію бываетъ печальное, иногда же раздутое, не обыкновенно красное, щеки синеваыя или весьма блѣдныя, или какъ будто чѣмъ замаранныя; глаза сверкающіе, налипыя кровью, или наполненные слезами. Языкъ въ началѣ бываетъ бѣловаты, или покрытъ изъ-сине-желтою плевою, послѣ же дѣлается сухимъ. Біеніе жилъ замѣчается полное и довольно швердое, такъ что не опытный врачъ можетъ въ началѣ считати горячку сію за воспалительную и ко вреду больного дѣлать кровопусканіе. Жаръ въ началѣ бываетъ умѣренный, имѣетъ однако то особенное свойство, что подъ рукою прикасающагося увеличивается и производитъ

явственно не пріятное чувствованіе въ пальцахъ. Примѣчанія доспойно и то, что больной иногда не чувствуетъ жару въ таковой степени, какъ околостоящіе оной находятъ; иногда вовсе не жалуется на жаръ, но ощущаетъ холодъ. Не рѣдко же жалуется на внутренній жаръ и жажду, а въ наружныхъ частяхъ ощущаетъ содроганіе или ознобъ. Моча бываетъ водянистая и прозрачная. — Къ вечеру припадки сіи явственно умножаются, боль головы, жаръ, безпокойство дѣлаются сильнѣе; ночью замѣчается или совершенная бессонница, или сонъ, спрашными сновидѣніями безпрестанно прерываемый, и ни мало не ободряющій силъ.

Съ таковыми припадками продолжается болѣзнь иногда до 3, а иногда и до 7 дня, послѣ коего обыкновенно примѣпно умножаются всѣ болѣзненные явленія.

### § 3.

#### Умноженіе болѣзни.

Около шестаго или седьмаго дня появляется бредъ, а особливо ночью; боль-



ной часто вспааетъ съ постели и спарается убѣжать изъ комнаты, иногда съ такимъ усиліемъ, что и здоровые едва могутъ удержатъ его. Жаръ палящій продолжается съ сухостию кожи. Языкъ дѣлается сухимъ, распрескивается, иногда бываетъ не обыкновенно красенъ, весьма не рѣдко покрывается черною нечистотою, дрожитъ и волю больного не повинуется; или когда больной показываетъ языкъ, то часто забываетъ оной опять возвратитъ. Во рту и на зубахъ замѣчается много сгущенной слизи, смѣшанной съ кровью; губы синѣютъ; въ ноздрахъ засыхаетъ, иногда кажется, будто дымомъ замарано. Голосъ бываетъ слабъ, не вяшной, сиплою. Если больной что либо говоритъ, то обыкновенно заикается.

Жестокій бредъ рѣдко продолжается болѣе двухъ сутокъ, но большею частію около 8 — 9 дня больной приходитъ въ родъ нѣкошораго безчувствія и сонливости (Sopor), или онѣмѣнія (Stupor), такъ что никакихъ наружныхъ предметовъ и никого изъ предстоящихъ не



узнаешь, на вопросы не отвѣчаешь, или ежели и открываешь глаза, то смотришь взглядомъ поропливымъ, либо на одинъ какой либо предметъ усстремленнымъ; часто сбиваетъ съ себя покрывало, и всегда почти лежишь на спинѣ, раскинувши не порядочно руки и ноги. Жаръ на поверхности тѣла большею частію въ семь случаевъ уменьшается, напрошивъ не рѣдко примишишь можно, что лицо синѣетъ, руки и ноги бывають холодны и также синѣють, на коихъ, равно какъ на шеѣ, на груди, на бедрахъ и на другихъ частяхъ показываються красныя, иногда синеватыя пятна, похожія на тѣ, каковыя бывають отъ укушенія блохъ. Пятна сіи и при началѣ болѣзни не рѣдко уже замѣчаются.

Въ сіе время болѣзни пульсъ бываетъ слабой, дрожащій, мягкой и весьма переменчивой. Если больной силился сдѣлать какое либо движеніе, то ноги и руки дрожатъ; припомъ часто пальцами собираешь одѣяло, или стараешься уловить ложно ему представляющіеся въ воздухѣ



предметы, или, какъ въ просторѣчій говорится, безпрестанно ощищается. Дыханіе дѣлается труднымъ, воздухъ имъ выдыхаемый бываетъ иногда весьма тяжель и смрадный. Моча густая, изъ-темна-красная, иногда пропиву воли больного изтекаетъ, а иногда задерживается. Испражненія низомъ не рѣдко дѣлаются безъ всякаго чувства больного, иногда бываютъ жидкія и чрезвычайно смрадныя; при чемъ не рѣдко замѣчается икота и надутость живота (Meteorismus).

#### § 4.

#### Окончаніе болѣзни.

Если до сей степени достигла горячка, то разслабленіе тѣла бываетъ такое, что больной, кажется, совершенно въ параличномъ состояніи находится. Самъ ни подняться, ни повернуться не можетъ; но лежашъ большею частію на спинѣ, опустивши голову и раскинувши колѣна. Голосъ его исчезаетъ, глотаніе бываетъ чрезвычайно затруднительное. При семъ весьма

легко дѣлаются изъ разныхъ частей кровошеченія, кои не рѣдко случаются уже и въ самомъ началѣ болѣзни. Мѣста, нарывнымъ пластыремъ въ воспаленіе приведенныя, чернѣютъ; дыханіе бываетъ съ храпѣніемъ, біеніе жилъ скорое, не равное, перемѣжающееся; икота, судороги, за коими вскорѣ иногда слѣдуетъ и самая смерть. Не рѣдко же дыханіе съ храпѣніемъ, синета и раздушность лица продолжается до конца и болѣзни въ семь случаевъ оканчивается апоплексією. — Еслили горячка сопряжена съ мѣстнымъ воспаленіемъ; то оно удобно переходитъ въ англоновъ огонь, либо въ худое нагноеніе; таковое окончаніе болѣзни случается чаще между 9 и 14 днемъ.

### § 5.

#### Благополучное окончаніе.

Еслили болѣзнь продолжается уже болѣе 14 дней, то большею частію больной перестаетъ бредить; жесткость и сухость кожи уменьшается, но примѣчается по всей поверхности тѣла лег-



кая испарина; онѣмѣлость и безчувствіе (Stupor) прекращаются; глаза дѣлаются свѣжѣе, языкъ влаженъ и чище; моча натуральнѣе; позывъ на пищу возвращается, сонъ бываетъ покойной и силы больного подкрѣпляющій. Къ вечеру хотѣнія и умножаются нѣкоторыя припадки, однако ни бреда, ни жару не замѣчается.

### § 6.

#### Время выздоровленія.

Исключая постепенное возстановленіе испарины, большею частію безъ всякихъ другихъ критическихъ испражнений, наспукаетъ время выздоровленія, которое обыкновенно весьма бываетъ продолжительно. Сонъ и позывъ на ѣду возвращаются, однако больной все еще не въ состояніи бываетъ встать съ постели и при маломъ движеніи чувствуетъ слабость и дрожаніе въ мышцахъ. Лицо бываетъ блѣдное, впалое, иногда опеченное; часто замѣчается боль и опекъ въ ногахъ. Если въ семъ случаѣ больной не можетъ имѣть хорошаго питанія и

подвергается дѣйствию сыраго воздуха; по исправленіе его здоровья бываетъ весьма медленно. Напрощивъ возраждающія наклонности къ водяной болѣзни и обрюзглость во всемъ тѣлѣ (*Leucorhlegmatia*); особливо если во время горячки, или прежде оной были сильныя кровоточенія.

## § 7.

Описанная здѣсь горячка по причинѣ припадковъ, показывающихъ явственную наклонность къ гнилости называется гнилою (*Febris putrida*, *F. nervosa stupida*), или горячкою съ пятнами (*F. petechialis*), по причинѣ бывающихъ при оной пятенъ. Частыя и сильныя перемѣны въ состояніи атмосферы причиною того, что она чаще нынѣ въ госпиталяхъ и между народомъ примѣчается, нежели другой видъ горячекъ, которыя собственно называются нервными (*F. nervosae versatiles*). Дабы однако и о семъ видѣ горячекъ имѣть надлежащее понятіе, по предлагается здѣсь краткое онаго описаніе.



## НЕРВНАЯ ГОРЯЧКА.

Начало болѣзни.

У людей слабыхъ, чувствительныхъ, вѣдущихъ печальную жизнь въ сырыхъ и тѣсныхъ жилищахъ случается горячка, но съ явлениями и припадками, опѣ вышеписанныхъ опѣличными. Нѣсколько дней сряду, иногда недѣли двѣ болѣные чувствуютъ усталость, подергиваніе въ членахъ, какъ будто опѣ электрическихъ ударовъ; позывъ на ѣду перяется; сонъ бываетъ не спокойной, сновидѣніями прерываемой и ни мало не подкрѣпляющей; при сѣмъ замѣчается спящество, круженіе головы; боль въ поясницѣ, въ предсердіи; кожа жесткая, сухая и частыя содроганія, иногда по всему тѣлу, а иногда въ одной какой либо части, на примѣръ въ поясницѣ, въ спинѣ, въ брюхѣ. Пульсъ бываетъ малой, слабой, а при усиліи говоритъ явственно ускоряется; при сѣмъ помѣ болѣные спараются еще ходить, однако и опѣ малаго напряженія чувствуютъ круженіе и насущающій обморокъ. Въ чувстввахъ какъ наруж-

ныхъ, такъ и внутреннихъ примѣчается особенная, увеличенная чувствительность, такъ на примѣръ: глаза не могутъ переносить свѣта; всякой звукъ, голосъ говорящихъ, шумъ на улицѣ непрерывно возбуждаетъ впечатлѣніе въ ушахъ. Присемь уныніе и чрезвычайная раздражительность духа безпрестанно почти замѣчающіяся; тоска по роднымъ и по родинѣ непрерывно занимающія душу больного, отъ своей опечизны удаленнаго. Вообще душевныя чувствованія измѣняющіяся въ семь видѣ горячки, такъ что иногда и любезныя особы кажутся ненавистными. Къ вечеру или ночью замѣчается жаръ, однако не всегда; лихорадочныя ожесточенія (*febriles exacerbationes*) бывающія весьма безпорядочно; ибо иногда жаръ и содроганіе замѣчающіяся вмѣстѣ, на примѣръ жаръ ощущается въ головѣ, а въ рукахъ и ногахъ холодъ; иногда жаръ бываетъ съ мѣстнымъ потомъ; сильнаго же озноба хотя и не бываетъ, однако и во время жара, коль скоро разкрывается одѣяло, или употребляется холодное пище, то мгновенно



венно чувствуется подираніе по кожѣ, особливо ноги почти безпрерывно бывають холодны. Такія перемѣны случающіяся въ сушки нѣсколько разъ.

Наружной видъ показываетъ чрезмѣрную слабость и расстройство. Болѣзненные явленія большею частію бывають слѣдующія: блѣдное, впалое, иногда синеватое лицо, глаза тусклые, устремленные на одинъ какой либо предметъ, иногда сверкающіе и наполненные слезами; безпрерывной звукъ въ ушахъ, либо совершенная глухота; голосъ синоватой, измѣненной и пронзительной; дыханіе трудное, частыми вздохами прерываемое; бредъ тихой, къ ночи усиливающейся; моча прозрачная, водянистая, или густая, смрадная и въ маломъ количествѣ; частое судорожное подергиваніе въ мышцахъ лица и рукъ; икота и весьма [непорядочное испражненіе низомъ. Кромѣ сего замѣчается въ припадкахъ нѣкоторое прошивурчье, такъ на примѣръ: сухость во рту безъ жажды, бредъ безъ жару, съ медленнымъ пульсомъ, и. с. п.

## § 9.

## ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ НЕРВНОЙ ГОРЯЧКИ.

Чемъ долѣе продолжается и возраспаеть болѣзнь, тѣмъ болѣе уменьшается естественная теплота тѣла, пульсъ бываетъ весьма переменчивъ, а иногда медленнѣе натуральнаго. Нервная сія горячка рѣдко проходитъ безъ того, чѣмъ подъ конецъ оныя не присоединились припадки и явленія гнилой горячки, въ § 3 и 4 описанные, а наипаче, онѣмнѣе (Stupor) и сонливость (Sopor) (а особливо та, которую называютъ Патологи Coma vigil, въ коей больной непрерывно то засыпаетъ, то пробуждается); непроизвольное испражненіе кала и мочи, кровошеченіе, холодной потъ, пашна, пролежни и проч.

Умираютъ отъ нервной горячки иногда въ такое время, когда нѣтъ опасныхъ припадковъ, напрошивъ выздоравливаютъ иногда и такіе, кои казалось были уже при концѣ жизни. Въ прочемъ образъ смерти въ сей горячкѣ есть такой же, какъ и въ вышеописанной, то есть судороги, или апоплексія.



## § 10.

Продолженіе нервной горячки опредѣ-  
 лить никакъ не лзя. Иногда въ короткое  
 время дѣлается она смертельною, ино-  
 гда же продолжается болѣе трехъ не-  
 дѣль и даже до сорока дней. Въ сей го-  
 рячкѣ никогда почти не замѣчаются  
*критическія* испраженія, но при благопо-  
 лучномъ ея окончаніи мало по малу, хо-  
 тя медлѣнно, дѣйствія органическія при-  
 ходятъ опять въ порядокъ. Не малое  
 однако время продолжается еще сла-  
 бость; иногда долго еще примѣчается  
 сонливость и бредъ; обыкновенно же съ  
 тѣхъ поръ о наступившемъ выздoro-  
 вленіи заключить можно, когда позывъ  
 на пищу опять возраждается, бываетъ  
 покойной сонъ, уныніе проходитъ и воз-  
 вращается прежняя бодрость духа. Не  
 рѣдко однако тупость памяти, слабоу-  
 міе и глухота остаются еще долго.

Во время выздоровленія начинаетъ  
 слупляться кожа, и по сему какъ лицо,  
 такъ и все тѣло кажется, какъ будто  
 мукою усыпано; волосы падаютъ и воз-  
 раждается излишній позывъ на ѣду.

## § 11.

Описавъ сіи два главнѣйшихъ вида горячекъ, слѣдуетъ замѣтитъ, что въ припадкахъ бываетъ не рѣдко различіе, смотря по различію тѣлосложенія, рода жизни, причинъ, произведшихъ болѣзнь, и по различію предшествовавшихъ болѣзней. Здѣсь описано только то болѣзни прохожденіе, каковое нынѣ чаще замѣчается.

## § 12.

Не рѣдко горячки сіи бываютъ соединены вмѣстѣ съ воспаленіями внутреннихъ органовъ, а наипаче чаще теперь съ воспаленіемъ легкаго.

## § 13.

## Причины горячекъ.

Оба вида сихъ горячекъ рождаются отъ одинакихъ причинъ, а именно:

1) Воздухъ имѣетъ самое важное вліяніе въ произведеніи горячекъ. Всякія внезапныя перемѣны въ температурѣ, равно и измѣненія въ его качествѣ и различныя порчи безъ сомнѣнія могутъ безъ участія другихъ причинъ произвести сію болѣзнь. Наипаче же холодный



и вмѣстѣ влажный воздухъ, такъ же преисполненный гнилыми испареніями, какъ изъ расптій, такъ и живописныхъ произходящими, сильныя производить горячки и самыя обыкновенныя болѣзни дѣлаются опасными.

По сему не удивительно, что столь часто возраждаются жестокія горячки въ тѣсныхъ и сырыхъ домахъ, въ казармахъ, гдѣ помѣщено множество народу, въ гошпиталяхъ, гдѣ тѣсно расположены больные, въ тѣсныхъ съ безпреспаннымъ почти дымомъ крестьянскихъ избахъ, преисполненныхъ и людьми и всякаго рода живописными, на корабляхъ, въ большихъ лагеряхъ, въ осажденных многочисленныхъ городахъ, тѣсныхъ и сырыхъ тюрьмахъ и с. п.

2) Такое же почти дѣйствіе оказывающъ испаренія стоячей и согнивающей воды, а особливо въ жаркое лѣтнее время, наипаче буде жилища расположены на болотистыхъ мѣстахъ, подъ горами, или въ лѣсахъ, препятствующихъ свободному продуванію вѣтровъ.

3) Худая и гнилая пища, или недо-

спатокъ оныя, а особливо при трудахъ, уныніи духа и дурной погодѣ вскорѣ произраждаетъ горячки.

4) Народныя бѣдствія, общее уныніе, печаль и другія угнѣщающія спраспи, а особливо въ разлучившихся съ родными поска по отчизнѣ; излишнія напряженія и труды духа и тѣла, разспривающъ органическій сего послѣдняго порядокъ и сопровождающа опасными горячками.

5) Потеря крови и другихъ соковъ, а особливо сѣмени, такъ же излишнее употребленіе слабительныхъ весьма много участвоватъ могутъ въ произведеніи сей болѣзни, часпо бывающей повальнойю.

#### § 14.

*Повальныя* горячки происходятъ наипаче въ такое время, когда одинъ и тѣ же причины дѣйствуютъ на многихъ, вмѣстѣ находящихся людей. По сему не удивительно, что живущіе въ одной тѣсной, смрадной избѣ, питающіеся гнилою пищею, получаютъ одинъ за другимъ, или всѣ вмѣстѣ одинакаго рода болѣзнь.



§. 15.

Не лѣзя однако оприцать, что бы болѣзнь сія, не разпространялась иногда и посредствомъ зараженія: ибо при высокой степени оныя, особливо въ то время, когда наспушила уже онѣмѣлость, чувствъ (Stupor), не рѣдко возраждающа въ тѣлѣ особенное вещество, которое, дѣйствуя на околосстоящихъ, прикасающихся къ больному, производитъ въ нихъ таковую же горячку. Чемъ болѣе больныхъ, одержимыхъ горячкою, находилъ въ одномъ спѣсненномъ мѣстѣ; чемъ высшая степень сей болѣзни; чемъ менѣе возобновляется воздухъ и менѣе соблюдается чистота, и чемъ рѣже перемѣняется постель и бѣлье больного; тѣмъ удобнѣе возраждающа можетъ таковое заразительное вещество.

Изъ сего ясно видѣть можно, что нервныя и гнилыя горячки не всегда заразительны; но дѣлаются таковыми только при извѣстныхъ вышеписанныхъ обстоятельствеяхъ. Слѣдственно ошибаются тѣ, которые горячку почитаютъ во всякое время заразительною.

болѣзнію. — При перевозкѣ больныхъ, одержимыхъ жестокою горячкою, часто случается, что по деревнямъ и другимъ мѣстамъ, чрезъ копорыя провозимы бывають оныя больные, такого же рода оказывається болѣзнь, копорую по всей справедливости называють *наносною*: ибо она не происходитъ сама собою, но бываетъ нанесена проѣзжающими. Явственно можно иногда показать, какъ наносная сія болѣзнь отъ одного мѣста разпространяется къ другому, точно по тѣмъ самымъ дорогамъ и направлєніямъ, по коимъ на пр. проходили плѣнные, подвижныя госпитали и пр. Получають такую болѣзнь тѣ наипаче, кои имѣють уже болѣзненное расположеніе, копорое однако безъ случайной сей причины можетъ быть и не перешло бы въ самую болѣзнь.

§ 16.

По деревнямъ и по госпиталямъ, въ коихъ тѣсно расположены больные, горячки примѣнно размножаются зимою: поелику въ сіе время года не столь удобно возобновляется воздухъ въ тѣ



сныхъ деревенскихъ избахъ, въ коихъ часто, по вредному обыкновению, держится и мѣлкой скопъ. Къ сему надлежитъ присовокупить, что поселяне рѣдко бывають одѣты сообразно погодѣ; что часто съ печи прямо на спужу выходятъ безъ обуви, и безъ надлежащей одежды; что, по недоспапкѣ, или по вредному предубѣжденію, въ одномъ и томъ же плащѣ ходятъ до износу, и что въ зимнее время весьма не рѣдко закрываютъ въ избахъ своихъ печи, гораздо прежде, нежели перегорятъ совершенно уголья.

Къ выше изчисленнымъ причинамъ надлежитъ прибавить, что и сильные жары и излишнее употребленіе хмѣльных напитоковъ не рѣдко причиняетъ опасныя гнилыя и нервныя горячки. Сверхъ сего многія другія горячки, какъ то: простудная, желчная, желудочная, естли не подана будеть надлежащая помощь, переходятъ иногда въ нервныя и гнилыя.

## § 17.

## Располагающія причины.

Люди слабаго сложенія, раздражительнаго темперамента, ведущіе жизнь сидячую, живущіе въ сырыхъ покаяхъ, препятствующихъ обыкновенному испаренію испарины, отъ дѣйствія вышеозначенныхъ причинъ, чаще получаютъ настоящую *нервную горячку*. Напротивъ видъ горячки, который выше (§ 2 и 3) описанъ подъ именемъ *гнилой*, отъ вышеприведенныхъ причинъ случается чаще у людей молодыхъ, полнокровныхъ и крѣпкаго сложенія, а особливо когда горячка сообщается чрезъ заразу.

Вообще случается она у спариковъ рѣже, нежели у молодыхъ, а у мужчинъ чаще, нежели у женщинъ. Младенцы же, по наблюденіямъ многихъ Врачей, не заражаются сею горячкою. Томасъ говоритъ: часно случается въ воспитательныхъ домахъ видѣть, что дѣти сосутъ грудь матерей, одержимыхъ гнилою горячкою и оспаются совершенно здоровыми.



## § 18.

## Предсказаніе.

Въ горячкѣ бывають нѣкоторыя признаки, по коимъ съ вѣроятіемъ можно заключать о болѣе или менѣе опасности болѣзни. Признаки таковыя открываются либо:

а) По предшествовавшимъ причинамъ и свойствамъ горячки; такъ на примѣръ: горячки, произрастающія изъ желчныхъ, происходящія отъ заразы, отъ истощенія крови, также сопряженныя съ воспаленіемъ внутренностей, производимъ отъ слабости, опасны. Тѣ горячки въ коихъ не вся части организма равно страдаютъ, но въ одной какой либо части бывають припадки сильнѣе, весьма опасны.

Ведущіе не воздержную жизнь, пьяницы, цыганскіе, употребившіе много ртутіи, потерявшіе много крови, сѣмени или другихъ соковъ, получивъ горячку, подвергаются великой опасности.

Роженицы, беременныя женщины, и люди, имѣющіе завалы или другія какія либо поврежденія во внутренностяхъ;

такъ же юноши во время наступающей возмужалости (*tempore pubertatis*), естъли получаютъ горячку, то она бываетъ весьма опасна.

б) Либо по припадкамъ, сопровождающимъ горячку. Естъли на прим. замѣчается въ самомъ началѣ болѣзни безсиліе, большое измѣненіе лица, тоска и безпокойство, безсонница и бредъ, жесткая и сухая поверхность кожи, сильная боль въ головѣ, или поясницѣ и сильныя кровопеченія; то съ вѣроятіемъ заключаемъ можно, что горячка будетъ жестокая. Сверхъ сего всегда худые признаки суть слѣдующіе: лицо и руки синія, и таковыя же пятна по тѣлу; глаза красные, устремленные на одинъ предметъ; судорожныя движенія въ мышцахъ; подергиваніе сухихъ жилъ; прудное, съ храпѣніемъ соединенное дыханіе; языкъ дрожащій; голосъ оспрой, сиповатой; глотаніе воспрепятствованное; потъ мѣсной, холодной и клейкой; задержаніе мочи, или не произвольное оной и кала испражненіе; икота; непрестанная рвота, надутость живота (*Meteorismus*);



безпрерывной бредъ, или сонливоспъ; частыя кровотеченія. Такъ же весьма худо, еспли больной, тоскуя по своей родинѣ, оппачевается; еспли онъ по причинѣ бреда, или безпрерывной рво-ты, или по предубѣжденію дѣкарствъ принимаѣть не можетъ, либо не хочетъ; еспли самыя дѣйспвишительныя дѣкарства никакого уже возбужденія не про-изводятъ; еспли припадки оказывающ-ся не обыкновенные, одинъ другому не соопвѣсптвующіе на прим. пульсъ крѣп-кой со слабоспю; моча щакотав, какъ бываетъ въ здоровомъ состояніи, при жестпокихъ припадкахъ горячки и с. п.

*Примѣчаніе:* Само собою разумѣетсѣ, что объ опасности болѣзни не по од-ному какому либо признаку заключаѣть должно, но по многимъ вмѣспѣ, а по-тому, чемъ больше въ одно время замѣ-чается вышеизчисленныхъ худыхъ при-падковъ, тѣмъ явспвеннѣе и больше угрожающая опасность.

#### § 19.

Хорошее окончаніе горячки предска-зывать можно, еспли припадки между со-

бою соопвѣтствующъ; есѣли равно-  
мѣрная по всему шѣлу замѣчается исла-  
рина, причеѣ и излишній жаръ на по-  
верхности кожи уменьшается; есѣли  
сухость во рту и на языкѣ, проходитъ;  
есѣли глаза имѣютъ есѣстѣенный  
свой видъ; есѣли замѣчается бѣеніе  
жилъ, хотя и слабое, но ровное и мяг-  
кое; есѣли вышеизчисленныхъ худыхъ  
знаковъ нѣтъ, а особливо есѣли воз-  
вращается спокойной сонъ, безъ коѣго  
никакіе другіе признаки не важны;  
Замѣтивъ должно, что въ горячкахъ  
сихъ, а особенно нервныхъ и при опас-  
нѣйшихъ припадкахъ опчаевашься, и на  
прошивъ при малоѣажныхъ припадкахъ  
безпечнымъ быть не должно; ибо иногда  
подъ видомъ не важныхъ припадковъ скры-  
вается пагубная и смертоносная болѣзнь  
напрошивъ не рѣдко выздоравливаютъ  
таковыя больные, кои, казалось, спо-  
яли уже одною ногою во гробъ (§ 9.).

По сему и при всѣхъ хорошихъ при-  
знакахъ, есѣли обнаруживается одинъ  
какой либо не обыкновенной припадокъ,



то таковую горячку не должно считать за маловажную.

*Примѣчаніе 1.* Не должно думать, что во время выздоровленія опъ горячекъ вся опасность уже миновалась; ибо опъ малой неоспорожности произраждающія впоричныя горячки, кои обыкновенно бывающъ не сравненно опаснѣе.

*Примѣчаніе 2.* Горячки не рѣдко переходящъ въ Хроническія болѣзни, изъ коихъ особливо цынга, водяная болѣзнь, сухотка, параличъ и слабоуміе бывающъ иногда ихъ послѣдствіемъ.

## § 20.

### ЛѢЧЕНІЕ.

При лѣченіи сей удобно разпространяющейся и опасной болѣзни, надлежитъ исполнять слѣдующія правила:

*I. Удалить причины, производящія горячку.* — Симъ хотя не прекращается начавшаяся уже болѣзнь, однако большею частію не достигаетъ высочайшей своей степени; а сверхъ того и разпространеніе ея пресѣкается.

*II. Употребленіе лѣкарственныхъ средствъ*



располагать по времени и продолженію болѣзни.

III. Особенные припадки, дѣлающіе болѣзнь опаснѣе, надлежитъ особо и лѣчить; на пр. сильную рвошу, чрезмѣрной поносъ, кровотечение, пролежни и задержание мочи.

#### § 21.

##### I. Удаленіе причинъ.

Исполненіе перваго правила, то есть, удаленіе случайныхъ причинъ болѣзни, составляетъ особливо важный предметъ при эпидемическихъ нервныхъ горячкахъ. Въ семъ отношеніи надлежитъ обращать главнѣйшее вниманіе на слѣдующія обстоятельство:

Комната, гдѣ находится горячкою одержимый, должна быть просторна. Въ ней не должно находиться много людей, а особливо больныхъ. Какъ для здоровыхъ, такъ наипаче для больныхъ вредное, замѣчаемое у простаго народа обыкновеніе, держать мѣлкой скопъ въ избахъ, непременно должно быть изкоренено. Но, кромѣ живописныхъ, часто въ поселянскихъ избахъ, стоятъ кадки съ ки-



слою капустною, квасомъ, помоями; обсушивается мокрая одежда, бѣлье, и проч. Таковая неопрятность чрезвычайно вредна! Ибо воздухъ, преисполненный углекислымъ газомъ и другими вредными и гнилыми испареніями, исходящими изъ упомянутыхъ вещей, самая обыкновенная горячка можетъ превращать въ опасную.

Вообще за непремѣнное правило, при леченіи горячекъ, поставивъ должно, чтобы никакой нечистоты въ больничныхъ комнапахъ не было, и чтобы бѣлье, которое не рѣдко бываетъ замарано мокрою больнаго, или произвольными испраженіями, было перемѣняемо и поспѣшь выносимо вонъ. Ибо гораздо лучше лежать больному на чистой и часто перемѣняемой соломѣ, или сѣнѣ, нежели на поспѣли, загаженной мочою, попомъ, слизью и проч. Пospель и платье, употребляемая больными, одержимыми горячкою, должны быть провѣтриваемы, и, буде можно, вымываемы. Наипаче же никогда не должно вскорѣ ласъ больнаго на ту самую поспель,

на которой или либо умереть отъ горячки; но непременно должно на открывомъ воздухѣ провѣривать оную въ продолженіи 3 — 6 дней, а что можно вымыты въ горячемъ щелоѣ, сѣно же или солому, коими иногда наполнены бывають пюфяки, сжигать.

Для одержимаго горячкою надлежало бы избирать самое чистое и сухое въ комнатѣ мѣсто; однако, къ крайнему сожалѣнію, большею частію кладуть таковаго больного въ сырой и темной уголь, гдѣ безпрестанно находится онъ въ атмосферѣ, преисполненной собственными его болѣзненными испареніями. — Заключатъ больного въ постель, окруженную занавѣсками, значить умножать силу его болѣзни.

При размѣщеніи больныхъ по госпиталямъ и больницамъ надлежитъ строго наблюдать, чтобы горячкою одержимые не были располагаемы одинъ подлѣ другаго, и наипаче чтобы много таковыхъ больныхъ не было помещаемо въ тѣсной комнатѣ, ибо при таковаго естествознанія и неопасныя горячки перемѣня-



юпся въ гнидыя и дѣлаются смертоносными, и зло сіе разпространяется и на другихъ, вмѣстѣ лежащихъ больныхъ.

Для очищенія воздуха, испорченнаго животными испареніями, а особливо гдѣ по необходимости много находится больныхъ, нѣтъ лучшаго средства, какъ возобновленіе онаго либо посредствомъ огня, въ каминахъ или печкахъ разведеннаго, соблюдая то, что бы или вовсе не закрываемы были трубы, или не прежде, какъ по совершенномъ перегорѣніи углей; либо посредствомъ бензиплапоровъ, а въ лѣтнее время, при тихой погодѣ, посредствомъ растворенія дверей и оконъ, съ уваженіемъ пого, чптобы никто изъ больныхъ не находился на сквозномъ вѣтрѣ.

Для поправленія воздуха, кромѣ упомянутыхъ средствъ, съ пользою употреблять можно кислыя, такъ называемыя, *минеральныя* куренія, Гипономъ Мерво описанныя.

Генераль-Штабъ-Докторъ Крейшонъ предложилъ производить таковыя куренія самымъ простымъ образомъ, компо-

рой состоятъ въ слѣдующемъ: смѣшать четыре части поваренной соли съ одною частию марганца, въ порошокъ спертый и смоченный нѣсколько водою, потомъ наливаетъ на оныя по немногу купоросной кислоты. Произходящій отъ такового смѣшенія газъ пресыщенной соляной кислоты, постепенно наполняя комнату, поправляетъ содержащійся въ оныхъ испорченный воздухъ. Наставленіе, производить таковыя куренія, описано въ военной Фармакопее столь ясно и вразумительно, что гошпитальные врачи въ случаѣ надобности могутъ употреблять оное съ опмѣнною пользою \*).

Вдругъ и слишкомъ много не должно курить онымъ газомъ; ибо въ такомъ случаѣ дѣлается онъ для дыханія тяжелымъ. Гораздо лучше курить онымъ нѣсколько разъ въ сутки, но по немногу. вмѣсто сего можно употреблять для очищенія воздуха сжиганіе селитры, или наливаніе на оную купоросной.

\*) См. Pharmacopœia Castrensis Ruthena. Ed. II p. 390 et. 391.



кислоты; въ обѣихъ сихъ случаяхъ развивающійся селитренный газъ нечистоту воздуха уменьшаетъ. Но еслили между больными находятся такіе, кои страдаютъ удушьемъ, либо кашлемъ, или воспаленіемъ легкаго, или чахоткою; то куреніе газомъ пресыщенной соляной кислоты и селитреннымъ ожесточаетъ упомянутыя болѣзни, и потому въ такомъ случаѣ употребляемо быть не должно. Въ прочемъ газъ пресыщенной соляной кислоты съ осторожностію, какъ выше упомянуто, употребляемой гораздо полезнѣе селитреннаго, которой не имѣетъ столько разширяемости и для дыханія тяжелѣ. Равнымъ образомъ для поправленія воздуха при лѣченіи горячекъ служить можетъ и куреніе уксусомъ. Однако обыкновенный способъ сего куренія, т. е. наливаніе уксуса на раскаленное желѣзо, кирпичъ или камень, не только не поправляетъ воздуха, но еще болѣе портитъ оной. Ибо въ семъ случаѣ уксусная кислота разрѣшается, и вмѣстѣ уксусныхъ испареній, наполняется вся комната углекислымъ га-

сомъ, при разрѣшеніи уксуса произраждающимся. По сему гораздо лучше нагрѣвать какимъ либо образомъ уксусъ и доводить оной до испаренія, или брызгать онымъ на полъ, либо намоченнымъ салфеткой развѣшивать около больного. Посредствомъ сего воздухъ дѣйствительно наполняется уксусными испареніями, такъ что и по запаху можно оныя различать. Описанной въ военной Фармакопеи способъ куренія подъ названіемъ: *Vapores acidi acetici*, заслуживаетъ безъ сомнѣнія всякое уваженіе.

Употребленіе всякихъ другихъ куреній, какъ то смолою, можжевельными ягодами, куришельными порошками никакъ одобряемо быть не можетъ: ибо всѣ шаковыя куренія, прикрывая только запахъ испорченнаго воздуха, портятъ оный еще больше. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что, при сжиганіи ихъ, кислотворный гасъ, часть атмосфернаго воздуха, дыханію наипаче споспѣшествующая, уменьшается, напрошивъ производить отъ онаго куренія углекислый гасъ. Одно уже то, что отъ шаковыхъ куреній у



многихъ производить круженіе и боль въ головѣ, ясно доказывающъ, что оными воздухъ болѣе порпшется, нежели поправляется. Сожиганіе еловыхъ или можжевельныхъ вѣшвей иногда полезно быть можетъ, не по причинѣ производящаго при семъ дыму, но попому, что огнемъ, споспѣшествующимъ удобнѣйшему разширенію и возобновленію воздуха, болѣзненные испаренія испребляемы быть могутъ. Что касается до держанія дѣтѣю въ комнапахъ и до ношенія при себѣ чесноку; то первое, бальзамическими только испареніями наполняя воздухъ, конечно существенно не поправляетъ его качествъ. Послѣднее же хотя ни вреда ни пользы само по себѣ приноситъ не можетъ; однако безъ сомнѣнія основано не на опытѣ, но на предразсудкѣ, которой съ одной стороны даже и вреденъ быть можетъ; ибо простой народъ, бывъ въ швердомъ увѣреніи, что носимой на шѣлѣ чеснокъ предохраняетъ и отъ заразы и отъ горячекъ, не предпринимающъ никакихъ надежныхъ способовъ къ очищенію воздуха, и смѣ-

до, ввергается во всѣ случаи и причины, могущія возраждать опасныя болѣзни. Нѣмзя спорить, чѣобы употребленіе въ пищу чесноку и луку никогда не оказывало явственнейшей пользы; ибо вещества сіи въ такомъ случаѣ, дѣйствуя на умноженіе испарины, производятъ около человѣка, какъ бы особенную атмосферу, которою *вѣроятно* можетъ опражаться заразительное вещество; однако и сіе достоверными опытами не подтверждено.

Извѣстно, что растѣнія, находящіяся на солнечномъ свѣтѣ, поправляютъ воздухъ испареніями своими, состоящими въ такомъ случаѣ изъ кислороднаго газа; и потому въ лучшее время можно освѣжать воздухъ въ больничныхъ комнатахъ растѣніями, разставляя оныя на окошкахъ такъ, чѣобы они были освѣщаемы солнечными лучами. Впрочемъ естли растѣнія споятъ въ комнатахъ ночью, или и днемъ, но въ тѣни; то они не только не поправляютъ, но болѣе еще портятъ воздухъ испареніями, состоящими въ семъ случаѣ изъ у-



душливаго газа. Следствию обыкновеніе, усыпать полъ въ больницахъ свѣжею правою, или спавитъ около кроватей вѣтви деревь, на пр. березовыя и проч., полезно быть не можетъ. Изъ сего слѣдуетъ заключить, что въ больницахъ и комнахахъ, гдѣ лежатъ, одержимые горячкою, гораздо лучше не держать горшковъ съ растѣніями, а особливо съ цвѣтами.

Да проспипъ меня чипашель, что, говоря о горячкѣ, коснулся я сихъ предметовъ! Истинное убѣжденіе, что исправленіе испорченнаго воздуха, и чишота онаго есть одно изъ главнѣйшихъ средствъ при лѣченіи сей болѣзни, завлекло меня къ таковому разсужденію; а желаніе быть полезнымъ и споспѣшествовать по силамъ къ сохраненію общаго здравія, заставило меня упомянуть о нѣкоторыхъ вредныхъ привычкахъ.

§ 22.

Теплота въ комнахъ, гдѣ находятся одержимые горячкою, должна быть умѣрена. Наипаче при началѣ горячекъ, а

особливо, такъ названныхъ, *енилыхъ*, температура воздуха не должна превышать  $+14^{\circ}$  по термометру Реомюра. Въ продолженіи же оной, когда наступаютъ припадки онѣмнія (*Stadium Stuporis*), и въ настоящей нервной горячкѣ, такъ же въ горячкѣ, сопряженной съ сильнымъ кашлемъ, теплота должна быть нѣсколько больше, то есть по крайности  $+16^{\circ}$  по тому же термометру.

§. 23.

Говоря объ удаленіи причинъ, производящихъ горячки, надлежитъ упомянуть и о пищѣ. Всякую грубую, жирную и соленую пищу должно запретить больному. Сама натура даетъ намъ въ семъ случаѣ руководство: ибо всегда почти теряется въ началѣ сей болѣзни позывъ на ѣду. Посему въ такомъ случаѣ было бы безразсудно принуждать больного къ принятію пищи: ибо когда нѣтъ позыва на ѣду, то по принужденію употребленная пища надлежащимъ образомъ перевариваема бытъ не можетъ, а только, обременяя желудокъ, умножаетъ болѣзненные припадки.



Однако случается иногда, что больные чувствуют побужденіе къ принятію пищи; въ такомъ случаѣ конечно позволять можно легкую и нежирную похлебку, жидкую кашицу изъ ячныхъ, овсяныхъ, рисовыхъ крупъ, овсяной кисель, и с. п.

Нѣкоторые воображаютъ, что таковыхъ, кои впадаютъ въ горячки отъ недоставки питанія, должно кормить по больше. Заключение таковое неосновательно и весьма пагубно: ибо чѣмъ болѣе бываетъ человекъ помимъ голодомъ, тѣмъ слабѣе его желудокъ; а съ жадностію и въ большемъ количествѣ принятая пища не только не подкрѣпляетъ силъ его, но иногда мгновенную причиняетъ смерть. Посему и въ такомъ случаѣ съ великою осторожностію должно давать питательныя вещества, предписывая употреблять оныя, поперемѣнно съ лѣкарствомъ, въ самаго малѣйшемъ количествѣ, но почаще, на пр. каждый часъ или полчаса по столовой ложкѣ кашицы или говяжей похлебки, пока дѣйствіе желудка хотя нѣсколько возстановится.

Пищье также не рѣдко бываетъ причиною горячки и во время болѣзни безъ разбору даваемое можетъ усиливать оную.

Крѣпкіе напитки въ началѣ болѣзни полезны бытъ не могутъ. Во время сильнаго жара въ горячкѣ для утоленія жажды нѣтъ лучшаго для больныхъ питья, какъ чистая вода. Если нѣтъ у больного ни простудныхъ припадковъ, ни кашлю, ни воспаления внутренностей; то можно съ пользою давать даже холодную воду, съ пою оспорожностію, чѣобы не было сіе во время попу. При началѣ горячекъ можно оную смѣшивать съ какою либо распищельною, или минеральною кислотою. Сокъ клюквенной, или изъ другихъ кисловатыхъ, зрѣлыхъ и неизпорченныхъ ягодъ, уксусъ, сокъ лимонной въ соединеніи съ водою составляютъ приличное въ горячкахъ питье; особливо же вода, съ Галеровымъ эликсиромъ смѣшанная, такъ чѣобы только малая кислота ощущаема была составляетъ преполезное питье, какъ



въ нервныхъ, такъ наипаче въ гнилыхъ горячкахъ. Хлѣбный квасъ, сухарная вода, ячменный отваръ съ укусомедомъ въ пищѣ больныхъ употребляемы быти могутъ, съ пою оспорожностію, что бы въ то время не давали много кислаго пища, а наипаче квасу, и отвару съ укусомедомъ, когда у больного примѣчается поносъ. Виноградное вино въ соединеніи съ водою составляетъ также приличное въ горячкахъ пищѣ, однако не въ началѣ болѣзни, но тогда, когда обнаруживаются явственныя признаки разслабленія, или, иначе говоря, когда припадки сильнаго волненія (*Orgasmi*) и раздраженія въ тѣлѣ уменьшаются, а мѣсто ихъ заступаютъ припадки онѣмненія (*Stuporis stadium*). Пиво и портеръ во время горячекъ позволять не должно; но во время выздоровленія напитки сіи, умеренно употребляемые доставляютъ явственную пользу.

#### § 25.

Къ причинамъ, объ удаленіи коихъ врачъ при лѣченіи горячекъ помышляетъ

долженъ, причисляюся и душевныя возмущенія больного. Выше упомянуто уже, что печаль, страхъ, опчаяніе производятъ нервныя наипаче горячки. Обыкновенно однако и въ продолженіи болѣзни и даже во время уменьшенія насоящихъ припадковъ горячки, продолжается таковое болѣзненное состояніе души.—Щасливъ тотъ врачъ, который можетъ удалить сихъ враговъ, подрывающихъ корень здоровья и жизни! Никакія лѣкарства, дѣйствующія на тѣло не въ состояніи совершенно изгнать болѣзнь, если угнѣтающія душу страсти прекращены не будутъ. По сему истинное состраданіе, утѣшеніе, не на однихъ только пустыхъ словахъ основанное, но отъ искренняго источника произходящее, дѣлающъ въ семъ случаѣ то, чего и самыя лучшія лѣкарства произвестъ не въ состояніи. Одно соболѣзнованіе, доказываемое усерднымъ раченіемъ къ подаванію помощи спраждущаго, истинно облегчаетъ уже больного, а довѣренность усердіемъ пріобрѣтаемая, конечно до-



вершаетъ въ семь случаѣ доброе дѣло. Никогда не должно раздѣлять обязанностей врача отъ обязанностей человека!

Вотъ обстоятельства, на которыя должно обращать вниманіе при леченіи горячекъ, относительно удаленія причинъ, могущихъ поддерживать и умножать силу болѣзни! Теперь слѣдуетъ показать тѣ способы и правила, по коимъ лѣкарственная помощь въ сей болѣзни преподаваема быть должна.

### § 26.

II. УПОТРЕБЛЕНІЕ ЛѢКАРСТВЕННЫХЪ СРЕДСТВЪ ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬ ПО ВРЕМЕНИ И ПРОДОЛЖЕНІЮ БОЛѢЗНИ (§ 20.).

#### РВОТНЫЯ СРЕДСТВА.

Въ самомъ началѣ болѣзни, когда ощущается сильная головная боль, пощипаніе по кожѣ, отвращеніе отъ пищи, непріятной вкось во рту, тошнота, давленіе въ предсердіи, весьма полезно быть можетъ употребленіе рвотнаго средства, а особливо изъ корня

Ипекакуанны, или подлѣсника (*Radiciſ Asari Europaei*), полагая взрослому чело-  
вѣку порошокъ онаго въ ползолотника  
на пріемъ. Средство сіе тѣмъ нужнѣе,  
когда предъ болѣзнію предшествовала  
какая - либо неосторожность въ пищу;  
т. е. когда человекъ употребилъ или  
излишнюю, или худую и неудобовари-  
мую пищу. Но хотя бы и не было при-  
знаковъ обремененія желудка, или такъ  
называемыхъ желудочныхъ нечистотъ;  
то при всемъ томъ употребленіе рвош-  
наго средства въ началѣ горячки мо-  
жетъ быть весьма полезно. Оно иногда  
пресѣкаетъ болѣзнь, или по крайности  
препятствуетъ ей доходить до высо-  
кой степеніи. Даже и въ томъ слу-  
чаѣ, когда болѣзнь сообщается чрезъ  
зараженіе, употребленіе рвошнаго ока-  
зываетъ дѣйствительную пользу, уни-  
чтожая судорожные припадки и произ-  
водя испарину. Многіе, считая, что  
 рвошное умножаетъ слабость, а чрезъ  
то и самую причину горячки, боятся  
предписывать оное. Но опытъ явствен-  
но показываетъ, что таковое заключе-



ніе не основательно: ибо средство сіе, сверхъ удаленія вредныхъ желудочныхъ нечистотъ, чрезъ потрясеніе тѣла производитъ полезную перемѣну какъ въ кровообращеніи и отдѣлительныхъ органахъ, такъ и въ нервной системѣ. Исчислятъ здѣсь подробно тѣ случаи и припадки, при которыхъ рвотныя средства вовсе возбраняются, было бы бесполезно. Ибо безъ всякаго о семъ напоминанія каждой врачъ конечно различать можетъ, что средствъ сихъ не должно употреблять при воспаленіи внутренностей, при расположеніи къ кровохарканію, при грыжѣ, во время беременности и пр.

Вмѣсто Ипекакуанны предписывать можно иногда рвотную соль, полагая на пріемъ три грана, разтворивъ оныя въ 2 или 3 унціяхъ перегнанной воды. Но поелику часто производитъ она вмѣсто рвоты поносъ, или при рвотѣ оказываетъ иногда и слабительное дѣйствіе; то при началѣ горячекъ употреблять оную тогда только должно, когда дѣйствительно извѣстно, что не только

въ желудкѣ, но и въ кишкахъ находящ-  
ся нечистоты, которыя какъ произро-  
жденію, такъ и умноженію болѣзни спо-  
спѣшествовать могутъ. При началѣ го-  
рячекъ, сопряженныхъ съ желчными при-  
падками, употребленіе рвотной соли дол-  
жно предпочитать Ипекакуаннѣ, или по  
крайней мѣрѣ оба средства сіи упо-  
треблять въ соединеніи.

§ 27.

По употребленіи рвотнаго, или есть-  
ли оно и не было употреблено, съ поль-  
зою дается лѣкарство, составленное  
изъ средствъ, на опдѣлишительные сосу-  
ды кожи преимущественно дѣйствующ-  
щихъ, соблюдая то, чтобы не избирали  
для сего намѣренія сильно разгорячаю-  
щихъ и раздражающихъ веществъ. Ни-  
что, по моему мнѣнію, не усиливаетъ  
сполько жестокости болѣзни, какъ пре-  
небреженіе сего замѣчанія. Молодые вра-  
чи, предполагая аспеническое состоя-  
ніе ближайшею причиною нервныхъ го-  
рячекъ, въ самомъ еще началѣ сей болѣзни  
приступаютъ къ употребленію сильно  
возбуждающихъ средствъ, не разсуждая



о томъ, что легкія испражняющія средства, въ нужномъ случаѣ употребленныя, удаляя вредныя мокроты, угнѣшавшія органическія силы, оказываютъ по сему самому возбуждающее дѣйствіе. Неблаговременное употребленіе сильныхъ раздражающихъ и разгорячающихъ лѣкарствъ истинно придаетъ силу болѣзни такъ, что изъ простой горячки, могущей оканчиваться въ 3 — 7 дней, происходитъ не рѣдко жесточайшая нервная, или гнилая.

Выше въ § 2 изчисленные припадки, въ началѣ горячки замѣчаемые, какъ-то: лицо красное, глаза кровью налипые, жаръ, полное бѣненіе жилъ, доказываютъ явственнае раздраженіе кровеносныхъ сосудовъ, которое отъ разгорячающихъ средствъ неблагоприятно и неумѣренно употребленныхъ доходитъ вскорѣ до чрезвычайнаго раздраженія, удобно могущаго перемѣниться въ состояніе параличнае, т. е. чрезвычайную слабость показывающее.

ЛѢКАРСТВА ИСПАРИНУ ПРОИЗВОДЯЩІЯ.

И такъ въ началѣ сей болѣзни испарину производящія средства, особливо въ соединеніи съ сюрмянными, бывающъ весьма полезны. Употребленіе настпойки бузиннаго цвѣта, или шалфея, или иссопа съ Миндереровымъ спиртомъ и антимоніальнымъ виномъ 1), а въ пиѣ воды съ Галлеровымъ эликсиромъ, большею частію оказывающъ весьма полезныя дѣйствія. Если признаки скопленія крови въ головѣ явственны, головная боль и бредъ жестоки; то припущеніе пиявицъ къ вискамъ, или за ушами, бываетъ не бесполезно. Для уменьшенія же спремленія крови къ головѣ почаще прикладываяются на оную салфешки, намочен-

1) Rp. Florum Sambuci nigræ unciam dimidiam, infunde aquæ fervidæ lbj, stet per horæ  $\frac{1}{4}$  in digestionem;

Colaturæ adde

Acetatis ammoniæ liquidī uncias duas,  
Vini antimoniatī drachmam cum semisse et  
Syrupi cujuslibet unciam *m. dr.* s. capiat æger  
omni bihorio dimidium vasculi theani minoris  
(3j æquiparans).



ныя холодною водою. Неоднократно замѣчалъ я послѣ паковыхъ примочекъ явственнае уменьшеніе головоболѣнія и прекращеніе бреда.

### § 29.

#### Холодныя обливанія и ванны.

Холодныя омовенія тѣла, для излѣченія горячекъ въ Англіи и Германіи употребляемыя, заслуживаютъ дѣйстви-тельно особенное вниманіе. Еслили съ начала болѣзни раздѣпато до нага больнаго обливать съ головы до ногъ холодною водою, или сажать въ холодную ванну; то вскорѣ прекращается жаръ горячки, судорожное состояніе сосудовъ кожи явственно уменьшается и болѣзнь иногда въ короткое время совершенно излѣчивается. Средство сіе не сходствуетъ правда съ умснѣваніями тѣхъ, кои ближайшею причиною нервныхъ горячекъ поспавляютъ *слабость*, а дѣйствіе холода почищаютъ также всегда *разслабляющихъ*; но опыты, доказывая пользу холодныхъ ваннъ въ нервныхъ горячкахъ, тѣмъ самымъ упверждаетъ,

сколь такіа умщвованія не основа-  
пельны!

Г. Кол. Сов. Каменецкій за двадцать  
лѣтъ предъ симъ съ опмѣнною поль-  
зою въ Молдавіи употреблялъ холодныя  
вспрыскиванія и омовенія шѣла для из-  
лѣченія нервныхъ горячекъ. Да и сверхъ  
сего таковой способъ лѣченія не есть  
новой для Рускаго народа.

Однако само собою разумѣется, что  
холодныя ванны и таковыя же всасы-  
скиванія или омовенія не во всякомъ слу-  
чаѣ въ горячкахъ употребляемы бытъ  
должны. Посему не излишнимъ считаю  
исчислишь здѣсь шѣ обспояпельства,  
при коихъ холодныя омовенія оказыва-  
ють спасительное дѣйствіе. Обспоя-  
тельствва сіи суть слѣдующія:

1. Еслии по всѣмъ признакамъ и при-  
падкамъ горячка есть та, которую мы  
выше назвали *енилою* (*F. nervosa stupida*).

2. Еслии нѣтъ ни воспаления во вну-  
тренностяхъ, ни кашлю, ни насморку  
и припомъ дыханіе свободно.

3. Еслии кожа суха и жаръ, замѣча-  
емой на поверхности ея, дѣйствитель-



но превышаетъ обыкновенную температуру тѣла, а особливо естьли ощущается жара, которой у Папюлоговъ называется *Calor mordax*.

4. Естьли не наступило еще то время, въ которое органическія силы приходящъ въ параличное состояніе (*Stadium paralyticum*); но при всемъ томъ нервная система оказываетъ весьма малое дѣйствіе.

5. Естьли горячка произошла отъ заразы.

Напротивъ никогда не должно употреблять холодныхъ омовеній въ то время :

1. когда первые пупи обременены нечиспотошами;

2. когда больной чувствуетъ ознобъ или содроганіе;

3. когда замѣчаются: воспаленіе, кашель, трудное дыханіе, поносъ;

4. когда кожа покрыта бываетъ потомъ;

5. когда примѣчается излишняя оспротта, или раздражительность наружныхъ чувствій;

6. когда горячка есть та, которую мы назвали *нервною*.

Если все сии примѣчанія соблюдаются съ точностію; то опъ холодныхъ ваннъ, вспрыскиваній, или обливаній тѣла примѣпно уменьшается палящій жаръ, пульсъ дѣлается медленнѣе, чрезмѣрная сухость и жесткость, на поверхности кожи замѣчаемая, перестаетъ, бредъ умалывается, больной засыпаетъ спокойно и горячка иногда въ три дни совершенно пресѣкается. Дѣйствія сии тѣмъ примѣннѣе, чѣмъ заблаговременно приступаютъ къ употребленію сего средства. Имѣвши подъ надзоромъ Клиническую больницу, многократно предписывалъ я холодныя ванны съ опмѣнною пользою, обливанія же холодною водою употреблялъ мнѣ не случилось. Удобнѣе однако считаю я, вмѣсто ваннъ, вспрыскиваній и обмываній, вытираніе всего тѣла губкою или байкою, намоченною въ холодной водѣ. Способъ сей не сопряженъ съ тѣми неудобствами, каковыя случаются при употребленіи ваннъ, и сверхъ сего ча-



ще въ супки употребляемъ быть можеть. Не долженъ я однако скрывать, что въ двухъ случаяхъ съ прекращеніемъ горячки оказались опъ холодныхъ омовеній сильныя ломошныя боли. Что же касается до употребленія холодныхъ примочекъ головы, то никогда послѣ оныхъ не замѣчалъ я худыхъ послѣдствій, но на противъ видѣлъ весьма часто явственнае облегченіе припадковъ, даже и въ то время, когда насупающъ уже бредъ и сонливость (Sopor). Однако, къ сожалѣнію, рѣдко врачу удается видѣть бользни сію въ ея началѣ. Слѣдственно рѣдко встрѣчающія случаи употреблять сей способъ лѣченія.

### § 30.

#### Возбуждающія средства.

Еслили уменьшились уже припадки умноженнаго раздраженія и сверхъ того замѣчается языкъ дрожащій, подергиваніе сухихъ жилъ, бредъ, пульсъ слабой и скорой и сильныя лихорадочныя ожесточенія (Exacerbationes); то вмѣсто холодныхъ омовеній можно употре-

блять трение всей поверхности тѣла камфорнымъ спиртомъ, или камфорнымъ уксусомъ, или и опьяненнымъ проспымъ виномъ, а внутрь упошреблять легко-возбуждающія средства; на пр. корень мауна, дягиля, Виргинскаго змѣевника, въ соединеніи съ Гофманновыми каплями, или съ усладженнымъ селипреннымъ, либо солянымъ спиртомъ (2).

§ 31.

При упошребленіи сихъ средствъ надлежитъ соблюдать, чтобы помѣръ умноженія болѣзни предписывать лѣкарства, болѣе проницабельныя. Въ семъ случаѣ камфора заслуживаетъ предъ всѣмъ

2) Rp. Radicis concisae Angelicae Archangelicae,  
vel . . . . . Valerianae officinalis,  
vel . . . . . Aristolochiae serpentariae  
unciam dimidiam,

infunde aquae fervidae libr. j. per horae  $\frac{1}{2}$ ,  
colaturae refrigeratae adde

Aetheris vitriolici alcoholisati,]  
vel . . . . . nitrici . . . . . } 3ij. n. 1000  
vel . . . . . muriatici . . . . . }

Syrupi communis 3j. m. dr.—Dosis: Omni bi-  
horio dimidium vasculum theanum.



ми другими предпочтеніе. Употреблять  
оную можно либо въ микстурахъ (\*),  
либо въ видѣ порошка, назначая въ семь  
последнемъ случаѣ на приемъ ошъ одного  
до трехъ гранъ, и повторающа оныя, съ  
продолженіемъ выше (въ § 30) предписан-  
ныхъ лѣкарствъ каждые два часа (3).

Чѣмъ болѣе обнаруживаются принад-  
ки параличнаго состоянія, какъ-то: без-  
чувственность, недвижимость, непро-  
извольныя испраженія; тѣмъ болѣе и  
чаще летучія и проникающія средства  
употребляемы быть должны, на примѣръ:  
уксусной и сѣрной эфиръ, летучая ще-  
лочная соль и с. п. 4)

\*) *Mistura camphor. Excel. Wylie.*—*Pharma-  
copeia Castrensis Ruthena. Ed. 11. pag. 279.*

3) *Rp. Camphoræ rasæ grana duo, tria,  
Sachari grana decem.*—*Quovis bihorio pro dosi.*

4) *Rp. Aetheris sulphurici,  
Liquoris Cornu C. E. partes æquales.*—*Dosis:*  
*omni dimidia hora sumantur guttæ xv-xxx ex  
vino vel aqua.*

*Rp. Aetheris vitriolici unciam dimidiam,  
Camphoræ drachmam dimidiam. misce fiat  
solutio.*—*Excellentiss. Wylie.*—*Dosis: guttæ viginti  
ad quadraginta quavis hora.*

Къ вышеписаннымъ возбуждающимъ лѣкарствамъ въ семь случаевъ съ опшмѣнною пользою прибавлять можно цвѣтны бараньей травы 5).

### § 32.

Никогда не должно дѣйствовать на тѣло одною дорогою, напр. чрезъ желудокъ; но иногда и въ видѣ промывательныхъ предписывать возбуждающія средства. На сей конецъ послужить могутъ камфора и вонючая камедь въ соединеніи съ клейкими и ароматными веществамъ 6).

5) Rp. *Florum Arnicae montanae* drachm. duas,  
Rad. conc. *Aristolochiae Serpentariae* ℥℥,  
infunde aquae bullientis ℔j. per  $\frac{1}{4}$  horae,  
Colaturae refrigeratae addantur  
Aetheris vitriolici alcoholisati dr. duae,  
Syrupi simplicis ℥j. m. dr.

*Dosis:* Omni bihorio dimidium vasculum theanum.

6) Rp. *Camphorae cum mucilagine gummi Mimosae Niloticae contritae* dr. j.

vel

*Gummi-resinae F. asae fetidae vitello ovi solutae* dr. i℔.

Infusi *florum M. Chamomillae* ℥vj. dr. s. tepidum injiciatur.



карствъ въ крайнемъ безсиліи и безчувственности больного бываетъ превосходно, особливо когда замѣчается частая икота, ворчаніе и надутость живота (Meteorismus). Въ семъ послѣднемъ случаѣ промывательныя изъ тепловаго уксусу, либо изъ винограднаго вина не рѣдко оказываютъ опмѣнную пользу. Дѣйствию внутреннихъ лѣкарствъ способствуютъ раздражающія пренія кожи, особливо камфорнымъ спиртомъ, какъ уже упомянуто выше, также прикладываніе горчичниковъ (Sinapismi) и нарывныхъ пластырей, которые въ нервныхъ и гнилыхъ горячкахъ никогда не должно оставлять на кожѣ до толъ, пока сдѣлается пузырь: ибо происходящія послѣ сего язвинки долго не заживаютъ и во время выздоровленія весьма беспокоиваютъ больного. Прикладываются нарывные пластыри на верхнія, либо на нижнія конечности, а при затруднительномъ дыханіи на грудь.

### § 33.

При лѣченіи горячекъ надлежитъ обращать особенное вниманіе на то, имѣютъ

ли онѣ, нервной или гнилостной характеръ?

§ 34.

Средства уменьшающія расположеніе къ гнилости (Antisepsica).

Естьли пашна, кровотеченія, вонь изъ рта, надушое, синеващее лицо, показывающъ явственную склонность къ гнилости; то весьма полезно бываетъ къ выше приведеннымъ лѣкарствамъ присоединять употребленіе кислотъ, а особливо минеральныхъ, напр: къ предписанному подъ No 5 лѣкарству прибавлять Минзихтовъ сѣрной эликсиръ (Elixir vitrioli Mynsichti), либо давать соляную кислоту по 10 и 20 капель въ отварѣ сапуннаго или просвирнячнаго корня. Квасцы въ соединеніи съ камфорою въ семъ случаѣ также могутъ быть дѣйствительны, будучи предписываемы на приемъ по одному, либо и по два грана; равно и употребленіе вина оказывающъ весьма хорошее дѣйствіе.



## § 35.

СРЕДСТВА ДѢЙСТВІЕ НЕРВОВЪ ВОЗВУЖДАЮЩІЯ  
(Nervina).

Если же обнаруживается болѣе нервной характеръ горячки (§ 8. 9.); то кромѣ камфоры, Кабардинская спирта и опій опличное оказываетъ дѣйствіе (7). Когда замѣчается непрерывное душевное безпокойство, бредъ, судорожныя потрясенія въ мышцахъ и чрезмѣрная раздражительность наружныхъ чувствъ; то употребленіе Кабардинокой спирта въ семъ случаѣ опмѣнно одобряется (8). Къ сожалѣнію однако средство сіе не вездѣ можно имѣть, по причинѣ его дороговизны. Сверхъ сего наблюденіями доказано, что дорогое и часто поддѣльваемое сіе лѣкарство можно замѣнять бальзамическою янтарною смолою (*Resina succini balsamica*), ко-

7) Rp. Liqueurіs cornu Cervi E.

Aetheris sulphurici aa ʒi.

Tincturæ opii crocatæ ʒʒ m. dr.—Dosis: Omni 3 hora guttæ xx.

8) Rp. Moschi Orientalis grana tria — quinque,  
Camphoræ gr. duo,

Sachari gr. decem. — Sumat aeger omni 2 hora pulverem unum.

порая, будучи въ равномъ количествѣ принимаема, оказываетъ такую же почти силу, какъ и Кабардинская спруя.

Естьли къ сему присоединяются не произвольныя, частныя испражненія, безсонница, а наипаче буде и душевныя страсти не престають еще дѣйствовать, то умѣренное употребленіе оныя въ семь случаѣ бываетъ не бесполезно.

Въ нервныхъ горячкахъ можно употреблять неиспорченное виноградное вино съ опмѣнною пользою. Иногда по предубѣжденію или по причинѣ бреда, больные никакого лѣкарства принимаютъ не хотятъ; въ такомъ случаѣ хорошее вино можетъ замѣнять лѣкарства. Давать оное можно по двѣ споловыхъ ложки каждой часъ.

### § 36.

#### III. ЛѢЧЕНІЕ ПРИПАДКОВЪ.

Выше упомянуто уже, что многіе жестокіе припадки, сопровождающіе горячку, требуютъ особеннаго вратеванія; ибо естьли они не прекращаются, то человекъ подвергается опасности не столько отъ главной болѣзни, сколько отъ сихъ при-

падк  
ихъ  
осо  
ющі  
а.  
пре  
кисл  
квас  
ки.  
быт  
коп  
кров  
рячк  
прик  
чива  
ваніе  
са, и  
связо  
кусо

\*) Въ  
зам  
ше  
вре  
мед  
пен  
для  
тис



падковъ, либо опъ непосредственныхъ ихъ послѣдствій. Таковыя, пребующіе особаго лѣченія припадки суть слѣдующіе:

а. *Кровотеченія сильныя* пребующь вънутренняго употребленія минеральныхъ кислотъ, наипаче Галлерова эликсира, квасцовъ, шакже и коричневой наспойки. \*) Наружныя же пособія различны бытъ могутъ, смотря по часпи, изъ копорой выпекаеть кровь. На пр. при кровопеченіи изъ носа (копорое въ горячкахъ весьма не рѣдко встрѣчается) прикладываніе снѣгу къ вискамъ, примачиваніе головы холодною водою, впагиваніе въ носъ раствора бѣлаго купороса, или квасцовъ и вкладываніе въ носъ связочекъ, изъ корпи сдѣланныхъ, или кусочковъ березоваго прута, суть обы-

---

\*) Въ горячкахъ, нынѣ свирѣпствующихъ часпо замѣчаются кровопеченія изъ мочевыхъ путей, копорыя иногда случаются даже и во время выздоровленія. По наблюденію Г. Лейбмедика Мерца, внутреннее употребленіе перпеншина оказываетъ превосходное дѣйствіе для прекращенія сего припадка.

кновенныя и большею частію дѣйстви-  
тельные средства. Сими послѣдними,  
механически дѣйствующимъ средствомъ,  
большею частію удается удерживать  
кровопеченіе. — При кровопеченіяхъ изъ  
мапки, или изъ задняго прохода, кромѣ вну-  
треннихъ выше показанныхъ средствъ,  
употребляются съ пользою холодныя  
примочки и впрыскиванія изъ квасцовъ,  
или бѣлаго купороса.

б. *Задержаніе мочи.* Припадокъ сей про-  
израждается либо опъ параличнаго со-  
стоянія мышечныхъ волоконъ, случающа-  
гося во время горячки, либо опъ бреда,  
при коемъ больные забываютъ испу-  
скасть мочу, либо опъ судорожнаго спя-  
тиванія шейки мочевого пузыря. Задер-  
жаніе мочи можетъ сдѣлаться весьма  
опаснымъ, если его не примѣчаютъ.  
По сему врачъ никогда не долженъ за-  
бывать у больного, одержимаго бредомъ,  
обозрѣть количество испущенной мочи.  
Случается не рѣдко, что больные про-  
тивъ воли выпускаютъ по нѣсколько  
капель оной; въ семъ-то случаѣ наипа-  
че не должно вдаваться въ погрѣшность.



Ибо не смотря на таковое непривольное истечение мочи, большею частью задерживается еще въ мочевомъ пузырьѣ немалое оной количество. Къ удаленію сего припадка могутъ служить слѣдующія средства: втираніе лепшечей мази, или прикладываніе горчичниковъ (Sinapismi) повыше лобковыхъ костей; напominаніе больному, чтобы онъ дѣлалъ нѣкоторое усиліе къ мочеиспущенію; употребленіе промывательныхъ изъ отвара льнянаго сѣмени, или изъ льнянаго масла; прикладываніе повыше лобковыхъ костей пузыря, наполненнаго теплою водою и употребленіе внутрь настойки крапивнаго сѣмени съ прописываемыми судорожными средствами. Если же все сіе будетъ бесполезно; то вѣрный-шее средство состоитъ еще употребленіе катетера. Сими инструментомъ весьма часто избавляется больной отъ угрожающей опасности.

*с. Безпрерывная рвота.* Припадокъ сей въ горячкахъ тѣмъ болѣе тягостенъ, что обыкновенныя, по свойству горячки предписываемыя средства, по

причинѣ онаго, употребляемы бытъ не могутъ. Рвоту такую, зависящую отъ излишней раздражаемости желудка, часпо удается прекращать принятіемъ внутрь холоднаго винограднаго вина, или употребленіемъ камфоры, и Сиденгамовой настойки соннаго зелія, назначая оной капель по 5 на пріемъ, или малыми пріемами одной чистой холодной воды, или принятіемъ лѣкарства, извѣстнаго подъ именемъ *Риверіевой микстуры* (*Haustus, acidum carbonicum evolvens*). Къ уменьшенію сего припадка споспѣшествуетъ также прикладываніе около предсердія нарывнаго пластыря, либо пѣсты, съ горчицею смѣшаннаго.

Однако ежели рвота бываетъ съ икотю, съ болью, и сженіемъ въ желудкѣ, то въ такомъ случаѣ съ пользою даваемы бытъ могутъ клейкіе и нимало не раздражающіе отвары, на прим. салепной, просвирнячной, также миндальное молоко, или похлебка нежирная, съ цыпленкомъ приготовленная. Сверхъ сего смягчительныя промывательныя и припарки изъ мякы съ уксусомъ для пре-



кращенія рвошы въ семь случаѣ весьма дѣйствительны бытъ могутъ. При знакахъ воспаленія въ желудкѣ, или въ другихъ частяхъ, сопряженнаго съ нервною горячкою, весьма полезно бытъ можетъ благоразумное употребленіе сладкой ршупи (*Sub-turcias hydrargyri*), иногда съ малымъ количествомъ соннаго зелья и магнезіи. Предписывается она въ такомъ случаѣ по одному грану на пріемъ раза чепыре въ день, до уменьшенія припадковъ.

d. Поносъ. Сей припадокъ большею частію умножаетъ силу горячки. Благоразумный врачъ конечно можетъ различать тѣ случаи, гдѣ поносомъ удаляется причина болѣзни и жеспокосы оныя не только не увеличивается, но примѣтно уменьшается. Выше въ § 27 упомянуто уже, что и въ продолженіи горячки легкія испражняющія средства иногда бывають нужны; на пр., сладкая ршупъ съ ревенемъ и с. п. Но случаи шаковые весьма рѣдки. \*)—Къ прекра-

\*) Гамильшонъ утверждаетъ, что нервныя горячки излѣчиваются наиудобнѣе употребленіемъ слабительныхъ. Однако основывался на

щенію поноса, зависящаго единственно  
отъ разслабленія, служащъ клейкія и аро-  
машныя лѣкарства въ соединеніи съ сон-  
нымъ зельемъ 9); также Доверовъ поро-  
шокъ въ соединеніи съ порошкомъ изъ кор-  
ня колумбо 10); употребленіе вина, аро-  
машныя припарки, а иногда клисперы изъ  
уксусу или изъ угля, по совѣту Г. Каменец-

опытъ доказывающемъ дѣйствительную пользу  
описаннаго здѣсь способа лѣченія, всѣми почти  
опытными врачами преимущественно употре-  
бляемаго, можно сумнѣваться, что бы во всякомъ  
случаѣ, какъ Гамильтонъ предлагаетъ, способъ  
его былъ полезенъ.

9) Radicis Orchidis morionis ʒj coque cum aquæ  
communis s. q. per  $\frac{1}{2}$  horæ, colaturæ Hbj adde  
aquæ menthæ piperitæ] ʒiij.  
vel aquæ cinammomi

Tincturæ opii crocatæ ʒβ m. dr. — Dosis: Omni  
bihorio vasculum theanum dimidium.

vel;

Aquæ menthæ piperitæ ʒviiij.

Tincturæ opii ʒβ m. dr. — Dosis: Omni  
bihorio cochlearia duo.

10) Opii

pulveris rad. Calicoccae Ipecacuanhæ  $\overline{a}$  gr. β.

— — — Colombæ

Eleosachari menthæ  $\overline{aa}$  gr. x. sumat quater  
in die.



каго приготавливаемые 11). Сии послѣдніе, кажется, тогда особенно полезны бытъ могутъ, когда замѣчается наклонность къ гнилости и въ кишечномъ каналѣ опидѣляется много вѣшровъ. Внутреннее употребленіе шлокона дугля, описанное Г. Каменецкимъ, въ семь случаевъ оказываесть также весьма хорошее дѣйствіе. Равнымъ образомъ и соединеніе соляной кислоты съ опійною настойкою 12) явственную производить пользу. — Пищье больнымъ должно бытъ клейкованое, но безъ меду, на прим: опшваръ изъ ячной, овсяной, либо рисовой крупы, опшваръ просвирнячнаго корня, сухарная вода и с. п. Сжимающія же и горькія средства, какъ-то: кашкарильная корка, камеху и с. п. большею частію въ семь случаевъ не оказываютъ никакой пользы.

---

11) Pulveris carbonum unciam unam,  
misce cum infusi tepidi florum M. chamomillæ  
unciis sex, s. — *pro clystere.*

12) Acidi muriatici drachmam unam

Tincturæ opii drachmam dimidiam misce.—  
Sumantur omni bihorio guttæ 8—15 ex decoc-  
tura Orchidis morionis, vel rad. Colombae.

е. *Кашель*. Иногда и сей припадокъ бываетъ сіюль мучительнѣе, что ни днемъ ни ночью не даетъ больному никакого успокоенія. Для укрощенія его служатъ клейковашья, также сюрмянные, иногда съ соннымъ зельемъ соединенныя лѣкарства 13); а съ наружи прикладываніе на трудъ нарывнаго пластыря. Впрочемъ, еслили онъ зависить отъ воспаленія, или отъ другихъ какихъ либо причинъ, то въ такомъ случаѣ, сославляя припадокъ другой особенной болѣзни, по свойству ея и лѣчимъ бытъ долженъ.

г. *Пролежни* пребываютъ часпой перемѣны бѣлыя и постели; всего же болѣе спарашься должно, чтобы воспаленное мѣсто не было прижимаемо. По сему мягкія полотенца, свернутыя въ кольцо, можно подкладывать подъ больного такъ, чтобы воспаленное мѣсто входило во

13) Camphoræ grana sex,

Oxydi stibii hydrosulphurati præcipitati grana  
tria,

Opii granum unum,

Sachari drachmam unam. m. f. pulvis, divid. in  
6. p. aequ. — Sumat omni bihorio pulverem unum.



впадину такового кольца. Если только начинаетъ краснѣть отъ лежанія болящее мѣсто, то шренье онаго камфорнымъ спиртомъ и Гулардовою водою оп-  
 вращаетъ воспаление. Если же воспа-  
 ление уже сильно, то должно оное омы-  
 вать одною только Гулардовою водою.  
 Камфорный спиртъ, соединенный съ  
 яичнымъ бѣлкомъ, составляетъ также  
 хорошее въ семъ случаѣ лѣкарство. —  
 Когда же дѣлается рана, то необходи-  
 мо нужны бывающъ одни смягчающія  
 средства, а когда аншоновъ огонь, то  
 смягчающія припарки и раздражающія  
 присыпки, или прикладываніе тѣсна съ  
 мѣломъ, или присыпаніе углемъ оказы-  
 ваютъ полезное дѣйствіе.

*Примѣчаніе.* Главнѣйшіе сіи припадки,  
 по опаснымъ своимъ послѣдствіямъ, за-  
 служиваютъ особое лѣченіе. Не должно  
 однако думать, что и всѣ припадки, го-  
 рячку сопровождающіе, должны быть  
 особо лѣчимы. Спранно, не благоразум-  
 но и смѣшно было бы, если бы про-  
 тиву каждаго особаго припадка пред-  
 писывалъ особое лѣкарство. Сего шре-

буютъ непремѣнно тѣ только изъ нихъ, которые угрожаютъ явственною и скорою опасностію, прочіе же уничтожаются съ уничтоженіемъ главной причины болѣзни.

§ 37. **IV. ЛѢЧЕНІЕ ПРИ НАСТУПЛЕНІИ ВЫЗДОРОВЛЕНІЯ.**

Когда ожесточенія лихорадочныя уменьшаются, языкъ дѣлается влажнѣе и чище, сонъ возвращается, словомъ, когда наступаетъ время выздоровленія; то проникающія и раздражающія лѣкарства должно уменьшать, а на мѣсто ихъ предписывать горькія, подкрѣпляющія средства, каковыя суть: права тысячелистника, золототысячника, квассія, хина, корень горечавки 14) и проч.

14) Corticis grosse contusi Cinchonæ off.  $\mathfrak{z}\beta$  coque cum aquæ communis  $\mathfrak{z}\text{XIV}$  per  $\frac{1}{2}$  horæ, sub finem coctionis adde

Radiciſ concisæ Aristolochiæ Serpentariæ  $\mathfrak{z}\beta$  stent in digestionē per  $\frac{1}{2}$  horæ; colaturæ frigidæ adde Aetheris sulphurici alcoholisati drach. j.

Syrupi simplicis  $\mathfrak{z}\text{j}$  m. — Dosis: omni bihorio vel trihorio vasculum dimidium.

При семь должно наблюдать: 1) что бы они предписываемы были въ сопряженіи съ нѣкоторою частію летучихъ и проникающихъ средствъ 15); 2, что бы употребленіе оныхъ тотчасъ прекращать, коль скоро замѣчено будетъ большее лихорадочное ожесточеніе (*Febris exacerbatio*); ибо въ такомъ случаѣ полезнѣе бывають одни проникающія лѣкарства. — Къ лѣкарствамъ подкрѣпляющимъ, коихъ употребленіе во время выздоровленія опъ горячекъ весьма полезно бываетъ, относятся и Исландской мохъ, а особливо въ соединеніи съ Перуанскою коркою.

## § 38.

Пища во время выздоровленія должна быть легкая и пищательная; на пр. жа-

---

15) *Summatum A. millefolii*  
 vel . . . . *Gentianæ centaurii* } *ʒiij*  
 vel *Radicis* . . . . . *Iuleæ* } *ʒβ*  
 vel . . . . . *Gei urbani* } *ʒβ et similia coque per*  
*1/2 horæ cum aquæ lbj; colaturæ adde*  
*Aether. nitrici alcoholisati ʒiβ.*  
*Syrupi cuiusdam ʒi m.*  
 Dosis eadem, ut N° 14.



ренная говядина, хорошая похлебка, молоко, яйца, шеляпина, свѣжая рыба, курицы и разная дичь. Кофей и шоколадъ привыкшимъ также позволять можно.

Болѣе всего спараться должно о доставленіи выздоравливающимъ свѣжаго и сухаго воздуха. — Проходка при ясной и умѣренно теплой погодѣ можетъ быть столь же полезна, какъ и самыя лучшія лѣкарства.

Въ прочемъ здѣсь не нужно повторять все то, что въ § 21 описано.

### § 39.

Изложивъ здѣсь самой дѣйствительнѣйшій способъ лѣченія жестокой сей болѣзни, остаётся мнѣ въ заключеніе присовокупить, что гораздо удобнѣе отвращать опасность въ самомъ началѣ, нежели въ высшей ея степени. Слѣдственно тѣ правила, которыя предписаны для удаленія причинъ горячки и для лѣченія оной при ея возрожденіи, суть весьма важны. Опъ пренебреженія оныхъ рождается изъ маловажной болѣзни опасная горячка. Напрошивъ опъ надлежащаго выполненія оныхъ и же-

спокая въ началѣ горячка принимаетъ другое свойство и дѣлается удобоизлѣчимою.

Выше въ § 15. упомянуто, что по деревнямъ не рѣдко произрастаютъ *наносныя* горячки. Къ предупрежденію оныхъ надежнѣйшимъ средствомъ считая можно по наставленіе, о коемъ Медицинскій Совѣтъ, при Министрствѣ Полиціи учрежденный, въ мѣсяцъ своемъ (24 Декабря 1812 года) упоминаетъ, а именно:

а. Для проходящихъ чрезъ селенія больныхъ должно очищать пошребное число избъ;

б. Съ проходящими больными жители должны имѣть, сколь возможно, меньше сообщенія; и

с. По выведеніи больныхъ изъ селеній, избы, въ коихъ они находились, не вдругъ должны быть занимаемы жителями, но по крайности въ продолженіи трехъ дней провѣтриваемы, выметены, и тѣмъ можно, вымыты. — Сѣно же или солому, на коихъ лежали, больные, должно сжигать.

При появленіи же *появляемыхъ* горячекъ, кромѣ *врачебныхъ* средствъ, не должно упущать *общихъ* *мѣръ*, служащихъ къ отвращенію сего зла. Онѣ заключающіяся въ слѣдующихъ краткихъ правилахъ: 1) удаляться по возможности всякаго сообщенія съ больными; 2) соблюдать чистоту тѣла; 3) стараться о частомъ возобновленіи воздуха; 4) быть больше въ движеніи, нежели въ покое, однако не изнурять тѣла излишними трудами; 5) стараться, что бы какъ обыкновенная испарина, такъ и другія испражненія тѣла происходили порядочно; 6) съ пощимъ желудкомъ не подвергать себя дѣйствию сыраго и холоднаго воздуха; 7) избѣгать пресыщенія пищею, и всякаго излишества въ употребленіи хмѣльныхъ напитковъ; 8) мокрую одежду, или обувь не держать долго на тѣлѣ; 9) не ложиться на мокрой землѣ; 10) не надѣвать плащя, употребляемаго больными, развѣ по надлежащемъ провѣтриваніи и очищеніи онаго и 11) не предаваться унынію и печали, но сколь воз-




можно, сохранять спокойствіе и веселость духа. При вѣдѣніи дѣла

Тѣ же, кои по званію своему и по чинѣмъ колюбно обязываются имѣть непосредственное попеченіе о больныхъ, снраждающихъ горячкою, изъ предположенности должны чаще перемѣнять свое плащье, каждой разъ послѣ прикосновенія къ больнымъ вымывать руки уксуомъ или мыльною водою и предъ посѣщеніемъ больныхъ употреблять теплой чай, либо не много вина или водки. При малѣйшихъ же болѣзненныхъ признакахъ, какъ то, круженіи и тяжесть головы съ опвращеніемъ отъ пищи и разслабленіемъ тѣла, должно безъ отлагательства принять рвотное, какъ въ § 26 предписано, и въ прочемъ поступать сообразно, какъ съ правилами, выше сего показанными, такъ и съ тѣми, кои описаны въ *Наставленіи, какъ поступать съ больными, гдѣ нѣтъ лѣкарей*, изданномъ почтеннымъ врачомъ О. К. Каменецкимъ.

Такимъ образомъ поступая, можно предохранять себя отъ дѣйствія при-


чинъ, производящихъ горячку; а избавляя другихъ отъ пагубной сей болѣзни, часто прекращающей жизнь въ самую цвѣтущія лѣта, можно достигать того истиннаго удовольствія душевнаго, которымъ облегаются всякіе труды и улаживается всякая житейская горесѣнь.


---













ГПБ Русский фонд

18.4.3.198.